

のみ薬 爪水虫の治療法について

パルス療法 (1週間服用して3週間休む方法) イトラコナゾール

治療期間中、お薬をのむのは **合計21日間**



1週間のむ 3週間休む 1週間のむ 3週間休む 1週間のむ 3週間休む

経過を観察。治療を始めて6ヵ月後に爪の状態をチェックします。

のみ方

	投与前	1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月	4ヵ月	5ヵ月	6ヵ月
血液*	-	-	-	-	-	-	-
肝機能*	○	○	○	-	-	-	-

お体の状態によって、採血による肝機能検査を行うことがあります。


検査
●は必須
○は望ましい

1日 2回、食直後にのみ (1回 4カプセル)
服薬期間 3ヵ月
(1ヵ月のうち服薬するのは7日間のみ。あとは休薬するため、実際の服薬日数は21日間)
総治療費のめやす (3割負担の方)** **約35,700円**

お薬について

毎日服用する方法 テルビナフィン

治療期間中、お薬をのむのは **合計180日間**



毎日のむ。
(通常は6ヵ月間服用)

爪の状態をチェックしながら服用終了時期を決めます。

	投与前	1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月	4ヵ月	5ヵ月	6ヵ月
血液*	●	●	●	○	○	○	○
肝機能*	●	●	●	○	○	○	○

お薬を安全におのみいただくために、採血による肝機能/血液の検査を行います。
検査はのみ始める前に1度、のみ始めの2ヵ月は月に1回、少なくとも計3回は必須です。その後もお体の状態によって定期的に検査します。

1日 1回、食後にのみ (1回 1錠)
服薬期間 約6ヵ月 (爪の状態により服薬期間は異なります)
総治療費のめやす (3割負担の方)** **約26,870円** (6ヵ月服薬した場合)

毎日服用する方法 ホスラブコナゾール (ネイリン)

治療期間中 お薬を飲むのは**合計84日間**



毎日のむ。
84日間

食事に関係 なく1日1回1カプセル服用

従来の薬に比べ、肝機能の副作用が軽く日本国内の治療では、重症例がなく、服薬中止で全身軽快あるいは、回復しました。必要なら、血液検査します。

1日1回 食事に関係なく (1回1カプセル)

服薬期間 約3ヵ月
治療費用の目安 (3割負担の方) **約20,275円**